



FUNGICIDAS

Ficha Técnica

SEILU (piraclostrobina + boscalid)

Fungicida sistémico que posee acción preventiva y curativa con formulación a base de gránulos dispersables en agua.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Piraclostrobina: 12.80% metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil}(metoxi)carbamato.
Equivalente a 128 g I.A./kg.

Boscalid: 25.20% 2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida
Equivalente a 252 g I.A./kg.

Ingredientes Inertes: 62.00% Surfactante, humectante, dispersante, desintegrante y carga.

Formulación: Gránulos dispersables en agua

ESPECTRO DE CONTROL

Tizón temprano (*Alternaria solani*), **Cenicilla** (*Leveillula taurica*)



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa erradicante, que combina la acción de dos ingrediente activos piraclostrobina y boscalid ambos principios activos afectan la producción de energía de las células del hongo, afectando sus funciones vitales. Preventivamente actúa inhibiendo la germinación de la espora. La acción curativa y erradicante de piraclostrobina provoca la desintegración de las cadenas de esporas, inhibiendo consistentemente la esporulación, al mismo tiempo dejan de funcionar los sistemas de bombeo de la membrana celular. El lugar de acción, a nivel celular, es la cadena de respiración de la mitocondria. Boscalid inhibe la germinación de esporas. A nivel molecular inhibe la enzima succinato deshidrogenasa la cual es parte importante en el Ciclo de Krebs, afectando de esta manera el flujo de carbonos a los metabolitos como la cadena de ATP.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Recomendación
Jitomate Chile Papa Berenjena (SL)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	700 - 800 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación 550-650 L/ha.

() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite.
Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 hr.

REGISTRO RSC0-MEZC-FUNG-1301A-X0062-420-38.00

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 5

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Con el equipo de seguridad puesto, abra cuidadosamente la bolsa y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla de la dosis a emplear de **SEILU** en un recipiente limpio y por separado con agua limpia e inicie la agitación. Complete con agua la capacidad del tanque y continúe con la agitación.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (DL₅₀, CL₅₀)

Toxicidad	Resultado
Oral (DL ₅₀)	5000 mg/kg
Dermal (DL ₅₀)	>2000 mg/kg
Inhalación (CL ₅₀)	>5 mg/L

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Aplicar en aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice 550-650 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con vientos mayores de 10 km/h, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD

No se mezcle con otros plaguicidas.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.