



# HERBICIDAS

# Ficha Técnica

## CLENPLEX (fomesafen)

Herbicida agrícola, selectivo para cultivos de frijol y soya.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**FOMESAFEN:** 21.70% 5-(2-cloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro -p-toliloxi)-N-mesil-2-nitrobenzamida. Equivalente a 250 g i.a./L a 20 °C

**Ingredientes Inertes:** 78.30% Neutralizante, Humectante, Antiespumante y Diluyente

**Formulación:** Concentrado soluble

### ESPECTRO DE CONTROL

**Verdolaga** (*Portulaca oleracea*), **Malva** (*Malva parviflora*), **Quintonil** (*Amaranthus hybridus*), **Aceitilla** (*Bidens pilosa*), **Quelite Cenizo** (*Chenopodium album*)



### MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

**CLENPLEX** es un herbicida de contacto, selectivo a los cultivos de soya y frijol para el control post-emergente de la maleza indicada en la etiqueta. Se aplica en post-emergencia de los cultivos de soya y frijol.

## Cultivos | Recomendaciones de uso

| Cultivo     | Malezas                                                                                                                                                                                                                                          | Dosis           | Recomendaciones                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frijol (SL) | <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br><b>Malva</b> ( <i>Malva parviflora</i> )<br><b>Quintonil</b> ( <i>Amaranthus hybridus</i> )<br><b>Aceitilla</b> ( <i>Bidens pilosa</i> )<br><b>Quelite Cenizo</b> ( <i>Chenopodium album</i> ) | 0.75 - 1.0 L/ha | Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación sugerido 250 L de agua/ha. |
| Soya (SL)   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                       |

( ) = Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin Límite

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

**REGISTRO** RSCO-HEDE-0263-X0686-375-21.7

## PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 5

## MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto: (mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta, lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (DL<sub>50</sub>, CL<sub>50</sub>)

| Toxicidad                      | Resultado    |
|--------------------------------|--------------|
| Oral (DL <sub>50</sub> )       | 2,144 mg/kg  |
| Dermal (DL <sub>50</sub> )     | 10,697 mg/kg |
| Inhalación (CL <sub>50</sub> ) | 5.727 mg/L   |

## MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

## CONTRAINDICACIONES

No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

## INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.