



HERBICIDAS

Ficha Técnica

DESYERBAL 90 (atrazina)

Herbicida agrícola, Gránulos dispersables en agua.
Mantiene al cultivo libre de malezas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Atrazina: 6-cloro-N2-etyl-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 900 g I.A./kg) 90.00%

Ingredientes Inertes: Humectantes y Dispersantes 10.00%

Formulación: Gránulos dispersables en agua



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Desyerbal 90 es un herbicida formulado como gránulos dispersables. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza en el cultivo de maíz.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones
Maíz (0)	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Zacate Grama (<i>Cynodon dactylon</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Lechuguilla (<i>Sonchus oleraceus</i>) Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>)	1.5 – 2.5 kg/ha	Realizar una aplicación en preemergencia al cultivo y a la maleza ,volumen de aplicación sugerido 300- 400L de agua/ha.
			Realizar una aplicación en post- emergencia temprana al cultivo y a la maleza, asegurarse de que esta sea menor de 5 cm (3 a 4 hojas); volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha

()= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 12 h después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la maleza.

REGISTRO RSCO- HEDE-0204-X0583-420-90.0

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 5

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Abra la bolsa por la parte superior, teniendo cuidado de no derramar o inhalar el producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo de aplicación con agua limpia, agregue la dosis recomendada de **Desyerbal 90** lentamente, resbalándolo por las paredes del tanque para evitar salpicaduras, posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento. **Desyerbal 90** puede ser aplicado con mochila aspersora manual. Mantenga la mezcla en agitación durante su aplicación. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES

Aplique al inicio del cultivo en preemergencia.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

En Pre-emergencia: Aplique **Desyerbal 90** después de que brote el cultivo.

En Post-emergencia: Aplique **Desyerbal 90** después de que brote la maleza, pero antes de que alcance los 5 cm de altura. El efecto se notará dentro de los 10 a 15 días posteriores o antes si hay humedad.

Como la acción de éste producto depende de la humedad del suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD

Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a fin de asegurar que no haya efectos fitotóxicos. Este producto no se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Solo debe mezclarse con productos registrados y autorizados en los cultivos aquí indicados.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS

(DL₅₀, CL₅₀)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	2500 mg/kg
Dermal agudo	2000 mg/kg
Inhalatorio agudo	>5.198 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.