



HERBICIDAS

Ficha Técnica

SERPIENTE (Saflufenacil)

Serpiente es un herbicida formulado como Gránulos dispersables en agua utilizado para el control de las plagas.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Saflufenacil: 70.0% N'-[2-cloro-4-fluoro-5-[1,2,3,6-tetrahidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-il]benzoil]-N-isopropil-N-metilsulfamida (Equivalente a 700 g/kg de i.a.)

Ingredientes Inertes: Dispersantes, humectante, antiespumante y vehículo 30.0%

Formulación: Gránulos disispersables en agua



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Herbicida con acción sistémica y residual, de post-emergencia, especialmente indicado para el control de las malezas en los cultivos indicados en el cuadro de Recomendaciones de Uso

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones
Arroz Avena Cebada Centeno Maíz Sorgo Trigo (SL)	Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Ojo de pollo (<i>Sanvitalia procumbens</i>) Rosa amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	0.07 – 0.08 kg/ha	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia dirigida al cultivo y post-emergencia temprana a la maleza; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Lima Limón Mandarina Naranja Tangerina Toronja (SL)	Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Alambrillo (<i>Polygonum aviculare</i>) Lechuguilla (<i>Sonchus asper</i>) Acahual (<i>Tithonia diversifolia</i>) Falsa verdolaga (<i>Trianthema portulacastrum</i>) Campanita (<i>Ipomoea tiliacea</i>)	10 – 15 g/100 L de agua	Realizar una aplicación foliar en post-emergencia dirigida a la maleza; volumen de aplicación sugerido de 250 L de agua/h

()= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 3 hr. después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la maleza.

REGISTRO RSC0-HEDE-0623-X0428-420-70.0

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 5

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria SERPIENTE de acuerdo a las dosis indicadas adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	>2000 mg/kg
Dermal agudo	>2000 mg/kg
Inhalatorio agudo	>5 mg/L

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

El envase del producto debe abrirse cuidadosamente utilizando el equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. Preparación del caldo de aspersión: Agregue agua limpia al tanque del equipo de aplicación aproximadamente a la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad necesaria de Serpiente, para el caso de aplicaciones en post-emergencia adicionar 5 ml de un coadyuvante no iónico por cada 10 L de agua, llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante. Utilice el equipo de protección personal declarado en la parte izquierda de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda SERPIENTE en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en su etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.