



INSECTICIDAS

Ficha Técnica

ANAPHOS 50 CE (diclorvos)

Insecticida-acaricida organofosforado de amplio espectro en el control de plagas y ácaros.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

DICLORVOS: 50.000% 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato.
Equivalente a 550 g de i.a./ L a 20 °C

Ingredientes Inertes: 50.000% Disolvente, Emulsificante y Compuestos relacionados.

Formulación: Concentrado emulsionable

ESPECTRO CONTROL

Gusano alfiler del tomate (*Keiferia lycopersicella*), **Minador de la hoja** (*Liriomyza spp.*), **Pulgones** (*Aphis spp.*), **Mosquita blanca** (*Trialeurodes spp.*), **Chicharritas** (*Empoasca spp.*), **Araña roja** (*Tetranychus spp.*), **Chicharrita** (*Empoasca fabae*), **Araña roja** (*Tetranychus spp.*)



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Anaphos 50 CE actúa por inhalación, ingestión y contacto; inhibidor de la colinesterasa; se caracteriza por su capacidad de penetración y volatilidad; no es persistente, una vez aplicado se evapora y pasa a la atmósfera donde se descompone con rapidez; sufre hidrólisis en medio húmedo, y se degrada bastante rápido siendo su vida media de 2 a 8 horas en suelos arenosos y limosos.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Plagas	Dosis	Recomendaciones
Jitomate (1)	Gusano alfiler del tomate (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	1.25 - 1.5 L/ha	Aplicar con suficiente agua para tener una cobertura total de la planta.
	Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp.</i>)		Aplicar mojando bien el follaje.
	Pulgones (<i>Aphis spp.</i>)	0.5 - 0.75 L/ha	Aplicar mojando bien hasta llegar al envés de la hoja.
	Mosquita blanca (<i>Trialeurodes spp.</i>)	1.25 - 1.5 L/ha	Aplicar mojando bien las partes tiernas del follaje.
	Chicharritas (<i>Empoasca spp.</i>)	0.75 L/ha	
	Araña roja (<i>Tetranychus spp.</i>)	0.75 - 1.0 L/ha	
Pepino (1)	Chicharrita (<i>Empoasca fabae</i>)	1.0 L/ha	Aplicar mojando bien el follaje.
	Araña roja (<i>Tetranychus spp.</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Aplicar mojando bien la parte interior del follaje.

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin límite.
Periodo de reentrada al área tratada: 96 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo de aplicación con agua limpia, agregue la dosis recomendada de **ANAPHOS 50 CE** lentamente, resbalándolo por las paredes del tanque para evitar salpicaduras, posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento. Para aplicación terrestre, diluir en 200 a 300 L de agua/ha; para aplicación aérea, diluir en no menos de 30 L de agua/ha. Emplear en todos los casos boquillas que procuren una aspersión fina para el buen cubrimiento del área foliar y aprovechar mejor la fase gaseosa del producto.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

ANAPHOS 50 CE puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.

No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

CONTRAINDICACIONES

No se aplique en horas de calor intenso, con el viento en contra, ni cuando éste sea fuerte (más de 15 km/hr).

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con los insecticidas que se aplican al follaje. No se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Solo debe mezclarse con productos registrados y autorizados en los cultivos aquí indicados.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (DL₅₀, CL₅₀)

Estudio	Toxicidad
Oral (DL ₅₀)	80 mg/kg
Dermal (DL ₅₀)	120 mg/kg
Inhalación (CL ₅₀)	0.083 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.